

Лозанна 25 мая 2021 года

Ребенок Пономарева Серафима родившаяся 04.10.2017 Казахстан

Отчет о наблюдении

Серафима была обследована под наркозом 20 мая 2021 года

Диагностика:

- Односторонняя семейная ретинобластома OD
 - генетический анализ рекомендуется
 - Мама при двухсторонней ретинобластоме, энуклеацией OG, а затем 6 курсов химиотерапии системных.
 - Сделали 6 курсов системной химиотерапии (Винкристин, Этопозид, Карбоплатин) (1-ое лечение: 10.01.20, 6-е лечение 05.05.20) (Казахстан)
 - Сделали 4 инъекции интра-вitreальная Мелфалан 20мг OD (19.06.20, 05.08.20, 09.08.20, 14.10.20)(Казахстан)
 - Сделали инъекция интра-вitreальная Eylea OD (26.11.2020,25.01.2021)
 - Сделали инъекцию интра-артериальную Мелфалан OD (02.12.20, 23.12.20)
 - Сделали инъекцию интра-артериальную сочетание Мелфалан /Топотекан OD (28.04.21)
 - Сделали криотерапию OD (25.01.,29.03,26.04.21)
 - Сделали термотерапию OD (26.04.21)
 - Сделали инъекцию внутри стекловидного тела Мелфалан OD(26.04.21)
- MRT (10.01.2020) подозрение на рецидив опухоли. Отсутствие экстерниоризации (анатомически) Tumor Board 03.12.2020 нормальная шишковидная железа. Следующая MRT в ноябре 2021 года.

Операция :ESN

К сегодняшнему дню мы сделали следующие выводы

Давление глаз:

OD: 7,1 мм

OG:17 мм

Осмотр глазного дна:

OD: нерв тумара свободный оптически.основная опухоль на меридиане 7часов , кальцифицирована в своей большей части, имеет незаконченный вид в предшествующем. Сетчатка полностью отсоединена. Исследования периферической сетчатки с углублением показывает интра-вitreальная в инферовесочной аморфной форме. Субретинианские семена,похоже, полностью регрессировали.

OG: офтальмоскопия в непрямой форме с углублением всей периферии не показало подозрительных поражений.

Флуоресцентная ангиография

OD: отсутствие Ирийного рубцова. Сосудистая сетчатка с трудом визуализируется. Ишемия сетчаткисмежду меридианами 3ч и 6ч

OG:исследование в пределах нормы

Эхо В

OD: выпячиваниеопухоли в 2,44 мм

Обсуждение:

Онкологическая революция, по-видимому, благоприятна с регрессией. диффузных субретиниовна костном уровнепо сравнению с последним контролем.Отслойка сетчатки остается полной. В 12ч меридианы был обнаружен шрам от криокоагуляции . Мы держали индикацию к современной

интерартериальному вприскиванню Мелфалан и Топотекан в ОД консолидация предполагаемой
26 мая 2021 в СНУМ

Затем Серафима будет пересмотрена для нового контроля под наркозом, а так же для обвязки доктором Степлером в течение 2 недель в случае подтверждения отсутствия опухолевой активности, то 4 июня 2021 года. Это вмешательство является единственным способом повторного прилежания сетчатки и функционального восстановления. Риски, связанные с этим вмешательством в случае осложнений (включая метастазы/дизертирование в случае активного экстериоризации опухоли при перфорации глаза), были объяснены родителям, которые понимают и принимают их.

Профессор Ф.Мунье,

Благотворительный фонд "Наши Дети" <https://nashideti.fund/>
Благотворительный фонд "Наши Дети" <https://nashideti.fund/>
Благотворительный фонд "Наши Дети" <https://nashideti.fund/>
Благотворительный фонд "Наши Дети" <https://nashideti.fund/>
Благотворительный фонд "Наши Дети" <https://nashideti.fund/>